

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CheckMite+ 1,360 g / impregnált csík méhkaptárban való alkalmazásra A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

SzillaMed Kft. (7754 Bóly, Ady u. 11.)

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH (Projensdorfer Strasse 324, Kiel, 24106 Németország)

European Pharma Hub Kft. (2360 Gyál, 7000/9 hrsz.)

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

CheckMite+ 1,360 g / impregnált csík méhkaptárban való alkalmazásra A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Egy 13,6 g-os csík tartalmaz:

Hatóanyag:

Kumafosz 1,360 g

4. JAVALLAT(OK)

Mézelő méhek *Varroa destructor* okozta fertőzésének kezelésére.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható mézhordás ideje alatt.

Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

6. MELLÉKHATÁSOK

A CheckMite+ készítménnyel való kezelés negatívan befolyásolhatja az anyanevelést és az anyásítást.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, ebben a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJ(OK)

Mézelő méh (*Apis mellifera L.*)

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Méhkaptárban való alkalmazásra.

Adagolás:

Kaptáronként 2 db CheckMite+ csíkot kell alkalmazni. A csíkokat két léputca közé kell felfüggeszteni, és 42 napon át bent kell hagyni. A javasolt 42 napos kezelési időt nem szabad túllépni. A csíkok csak egyszer használhatók fel.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A készítmény hatékonyságára vonatkozóan csak Langstroth, Zander, német normál és Dadant Blatt típusú kaptárok esetében végeztek vizsgálatokat.

A méhészet minden családját egyszerre kell kezelni.

A készítményt a hordás megkezdése előtt minimum 42 nappal, illetve a hordási időszakot követően alkalmazható.

A készítmény évente legfeljebb kétszer alkalmazható.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Méz: Nulla nap.

Nem alkalmazható mézhordás ideje alatt.

A csíkok alkalmazása és a mézhordás megkezdése között minimum 42 napnak el kell telnie.

A kumafosz feldúsulhat a viaszban, ezért a kezelt kaptárokból származó méhviasz nem bocsátható emberi fogyasztásra.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

30°C alatt tárolandó.

Közvetlen napfénytől védve tartandó.

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a címkén feltüntetett lejáratási időn belül szabad felhasználni! A lejáratási idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A tartály első felbontása után felhasználható: a zacskó kibontása után az összes csík azonnal felhasználandó.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan:

Az azonos hatóanyag csoportba tartozó varroa atka ellenes készítmények gyakori alkalmazása esetén az atkák az adott hatóanyaggal szemben rezisztensé válhatnak. A készítményt a varroa atka elleni integrált védekezés részeként ajánlott alkalmazni, a lehullott atkák számának folyamatos ellenőrzésével. Amennyiben az atkafertőzöttség növekedése tapasztalható, ajánlott a kezelést más hatóanyag csoportba tartozó készítménnyel folytatni.

A készítmény használati utasítástól eltérő használata növelheti a rezisztens atkák előfordulásának valószínűségét.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

Tavasszal legyengült családok esetében (melyek a lépek kevesebb, mint felét foglalják el) vagy nosemával fertőzött családok esetében csak gondos előny/kockázat elemzés után alkalmazható.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

Kumafosz iránti ismert túlérzékenység esetén az állatgyógyászati készítmény alkalmazásakor óvatosan kell eljárni.

Az állatgyógyászati készítmény előkészítése, alkalmazása során az alábbi egyéni védőfelszerelés viselése kötelező: impregnált kesztyű (gumi vagy latex anyagból) és megfelelő védőmaszk.

A készítmény alkalmazása közben enni, inni, dohányozni tilos. El kell kerülni a készítmény bőrre jutását. Alkalmazás után kezet kell mosni.

Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét.

Antidotum mérgezés esetén: 1% Atropin-szulfát injekció intramuszkulárisan.

Adagolás (ember): 0,2 – 0,5 ml. Az atropin injekció megismételhető, ha az atropin hatása megszűnt és a mérgezési tünetek (pupilla tágulat, izomremegés, hányás, hasmenés) perzisztálnak.

Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók:

Egyéb kolinerg hatású szerekkel (imidazotiazolok, tetrahidropirimidinek) egyidejűleg nem alkalmazható.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok):

Kétszeres dózis alkalmazása (4 db CheckMite+ impregnált csík kaptáronként) esetén a munkás méhek mortalitása és a kolónia erőssége nem mutatott statisztikailag szignifikáns különbséget az ajánlott adaghoz (2 csík kaptáronkénti alkalmazásához) képest. Szignifikáns toxikus hatás és nagyobb mortalitás mutatkozott négyszeres túladagolás (8 db CheckMite+ impregnált csík kaptáronként) esetén.

Inkompatibilitások:

Nem értelmezhető.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem a szennyvízbe, sem a háztartási hulladékba!

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

A CheckMite+ 1,360 g / impregnált csík méhkaptárban történő alkalmazásra A.U.V. nem kerülhet természetes vizekbe, mert veszélyes lehet a halakra és más vízi élőlényekre.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2016. december 16.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Kiszerezés:

10 csík többretegű (PET/alumínium/PE) zacskóban és karton dobózában.